

- > Chlamydia is in Nederland de meest voorkomende soa, vooral onder jonge mensen tot 25 jaar. Vaak merk je er niets van dat je deze soa hebt opgelopen, maar een niet-behandelde chlamydia kan ernstige gevolgen hebben. Chlamydia is goed te behandelen met antibiotica.

Wat merk je van chlamydia?

Een tot drie weken na besmetting met chlamydia kun je de eerste verschijnselen krijgen.

Vrouwen

De meeste vrouwen die chlamydia hebben opgelopen, merken dat niet. Een kwart van de vrouwen krijgt klachten die lijken op een blaasontsteking.

- Pijn of branderig gevoel bij het plassen
- Pijn en bloedverlies tijdens en na het vrijen
- Bloedverlies tussen twee menstruaties
- Meer of veranderde vaginale afscheiding
- Hevige pijn in de onderbuik, met of zonder koorts
- Ontsteking bekkengebied met koorts
- Irritatie of jeuk bij de anus, (bloederige) afscheiding bij de ontlasting en diarree

- > Een onbehandelde chlamydia-infectie kan zich naar de eileiders en de onderbuik uitbreiden. De eileiders kunnen dan dicht gaan zitten. Hierdoor heb je meer kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid.

Mannen

Mannen krijgen vaker klachten als ze chlamydia hebben opgelopen. Maar ook bij mannen krijgt de helft geen klachten.

- Pijn of branderig gevoel bij het plassen
- Afscheiding uit de plasbuis, vooral 's morgens
- Pijn in de balzak
- Irritatie of jeuk bij de anus, (bloederige) afscheiding bij de ontlasting en diarree

- > Bij mannen heeft chlamydia geen invloed op de vruchtbaarheid.

Andere klachten bij mannen en vrouwen

Na anale seks kan het slijmvlies van de anus ontstoken raken.

Dit kan jeuk, pijn of een branderig gevoel geven.

Keelontstekingen door orale seks komen bij chlamydia nauwelijks voor. Sommige mensen krijgen gewrichtsklachten.

Behandeling van chlamydia

Chlamydia is goed te behandelen met een korte antibiotica-kuur. Je partner moet bij voorkeur tegelijk met jou antibiotica slikken. Dit om te voorkomen dat je opnieuw wordt besmet.

Meer informatie over chlamydia
vind je op: soaids.nl/chlamydia

Partners waarschuwen

Vertel je sekspartner(s) dat je chlamydia hebt opgelopen. In ieder geval je partner(s) tot een halfjaar terug. Die kunnen zich dan laten onderzoeken, ook als ze geen klachten hebben. Dit is belangrijk, vooral voor je eigen gezondheid, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen.

- > Zie je er tegenop om je partner(s) zelf te waarschuwen? Vraag dan de GGD om dit (discreet) voor je te doen. Je kunt ook gebruik maken van partnerwaarschuwing.nl.

Aids Soa Infolijn

Heb je een vraag over chlamydia die deze folder niet behandelt?

- > **Bel de Aids Soa Infolijn:** 0900 204 204 0 (10ct p.m.)
Maandag en dinsdag: 10.00 – 18.00 uur.
Woensdag t/m vrijdag: 14.00 – 18.00 uur.
- > **Stuur een e-mail naar de Aids Soa Infolijn:**
Sense@soaids.nl je krijgt binnen twee werkdagen antwoord.
- > **Of bezoek het chatspreekuur op Soatest.nl**
Maandag t/m donderdag: 13.30 – 15.30 uur.

1e druk november 2014 | Voor het overnemen van informatie uit deze folder is toestemming nodig van Soa Aids Nederland.

Disclaimer

Soa Aids Nederland spant zich in om volledige, begrijpelijke en betrouwbare informatie aan te bieden in al haar voorlichtingsmaterialen en publicaties. Toch aanvaardt Soa Aids Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze folder. **De informatie in deze folder mag nooit worden beschouwd als vervanging van een consult of persoonlijk bezoek aan een arts of specialist.**