



SOAIDS

- > Gonorroe is in Nederland een veel voorkomende soa, die veel voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen. Deze soa wordt veroorzaakt door een bacterie (Neisseria gonorrhoeae of gonokok). Een niet-behandelde gonorroe kan ernstige gevolgen hebben. Gonorroe is goed te behandelen met antibiotica.

Wat merk je van gonorroe?

De bacterie kan een infectie veroorzaken van:

- de plasbuis
- de vagina en baarmoedermond
- de anus of
- de keel

Enkele dagen tot weken na besmetting kun je de eerste verschijnselen opmerken.

Vrouwen

Vrouwen die gonorroe hebben opgelopen, merken dat niet altijd. Als ze het wel merken kunnen ze last hebben van:

- Meer vaginale afscheiding, die vies ruikt of pusachtig lijkt
- Bloedverlies tussen twee menstruaties door
- Pijn of irritatie bij het plassen
- Irritatie of jeuk rond de anus
- Slijmerige of pus-achtige afscheiding bij de ontlasting
- Keelpijn

- > Een onbehandelde gonorroe kan dieper het lichaam in gaan en zich naar de eileiders en de onderbuik uitbreiden. De ontstoken eileiders kunnen dicht gaan zitten. Hierdoor heb je meer kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid. Zwangere vrouwen met een onbehandelde gonorroe lopen het risico op te vroege geboorte van de baby. Bij de geboorte kan de baby ook worden besmet en zo een oogontsteking krijgen.

Mannen

Mannen merken wel bijna altijd dat ze gonorroe hebben opgelopen. Ze kunnen dan de volgende klachten krijgen:

- Een 'druiper': (veel) pusachtige afscheiding uit de plasbuis die geel of groen van kleur is
- Pijn of irritatie bij het plassen
- Irritatie of jeuk rond de anus
- Slijmerige of pus-achtige afscheiding bij de ontlasting
- Keelontsteking of opgezette klieren in de hals

- > Een onbehandelde gonorroe kan dieper het lichaam in gaan en zich naar de bijballen of prostaat uitbreiden.

Behandeling van gonorroe

Gonorroe is goed te behandelen met een injectie met een antibioticum. Soms is nacontrole nodig. Tot een week na het begin van de kuur kan gonorroe nog besmettelijk zijn. Het is dan beter om geen seksueel contact te hebben of in ieder geval een condoom te gebruiken.

- > Zolang de soa niet is behandeld, kun je er anderen mee besmetten.

Meer informatie over gonorroe
vind je op: soaids.nl/gonorroe

Partners waarschuwen

Vertel je sekspartner(s) dat je gonorroe hebt opgelopen. Als je klachten hebt de partner(s) van de laatste 4-6 weken. Anders de partners van het afgelopen halfjaar. Zij kunnen zich dan met hun partners laten onderzoeken, ook als ze geen klachten hebben. Dit is belangrijk, vooral voor je eigen gezondheid, maar ook om verdere verspreiding van gonorroe te voorkomen.

- > Zie je er tegenop om je partner(s) zelf te waarschuwen? Vraag dan de GGD om dit (discreet) voor je te doen. Je kunt ook gebruik maken van partnerwaarschuwing.nl.

Aids Soa Infolijn

Heb je een vraag over gonorroe die deze folder niet behandelt?

- > **Bel de Aids Soa Infolijn:** 0900 204 204 0 (10ct p.m.)
Maandag en dinsdag: 10.00 – 18.00 uur.
Woensdag t/m vrijdag: 14.00 – 18.00 uur.
- > **Stuur een e-mail naar de Aids Soa Infolijn:**
Sense@soaids.nl je krijgt binnen twee werkdagen antwoord.
- > **Of bezoek het chatsprekuur op Soatest.nl**
Maandag t/m donderdag: 13.30 – 15.30 uur.

1e druk november 2014 | Voor het overnemen van informatie uit deze folder is toestemming nodig van Soa Aids Nederland.

Disclaimer

Soa Aids Nederland spant zich in om volledige, begrijpelijke en betrouwbare informatie aan te bieden in al haar voorlichtingsmaterialen en publicaties. Toch aanvaardt Soa Aids Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze folder. **De informatie in deze folder mag nooit worden beschouwd als vervanging van een consult of persoonlijk bezoek aan een arts of specialist.**